

IGSS - MINISTERIO DE SALUD - PERU

**Dirección General:**  
Dr. Fernando W. Ramos Neyra  
E-mail: [framos@hep.gob.pe](mailto:framos@hep.gob.pe)

**Sub-Dirección General:**  
Dr. Miguel Villena Nakamura  
E-mail: [mwillena@hep.gob.pe](mailto:mwillena@hep.gob.pe)

**Responsable del Reporte:**  
Dr. Hugo Mezarina Esquivel  
Jefe de la Oficina de Epidemiología y  
Salud Ambiental  
E-mail: [hmezarina@hep.gob.pe](mailto:hmezarina@hep.gob.pe)

**Equipo de Epidemiología y Salud  
Ambiental:**  
Lic. Ruth Castañeda C.  
Ing. Evelyn Becerra S.  
Srta. Carmen Navarro G.  
Srta. Rocío Marmolejo C.

**Teléfonos:**  
(511) 474-3200 /  
(511) 474-9820  
Anexo de Epidemiología: 260

**Web del hospital:**  
[www.hep.gob.pe](http://www.hep.gob.pe)


## CANALES ENDEMICOS 2016

**Semanas Epidemiológicas 31 a 35**

EndemicChannels, epiweeks 31 to 35

**Agosto del 2016**


# Canales endémicos



**Gráficos 1. Canal endémico de IRA, Todas las edades.**

Durante el año 2016 en las 35 primeras S.E se han reportado 8689 episodios de IRA, cifra superior al año anterior en 15.06%, donde se reportó 7552 episodios.



A lo largo de las 35 primeras semanas no se presentó ningún incremento inusual de casos, encontrándose la curva en la S.E 35 en la zona de seguridad.




**Gráficos 2, 3 y 4. Canales endémicos de IRA en menores de 1 año, 1-4 años y 5-14 años.**

El análisis de la IRA por grupos de edad, muestra que para la S.E 35 del 2016 en los menores de 1 año se presentaron 2277 episodios de IRA, superior en un 8.69% con relación al año anterior, en los de 1 a 4 años 4654 episodios de IRA y en los de 5 a 14 se presentaron 1722 episodios de IRA, lo que representó un incremento del orden del 19.95%, y 19.09% respectivamente, en relación al año 2015.

Durante las 35 primeras S.E del 2016 no se presentaron incrementos inusuales de casos, en ninguno de los grupos etarios, excepto en la S.E 30 en los de 1 a 4 años donde la curva se encontró en la zona de epidemia.








**Gráfico 5, 6, 7 y 8. Canales endémicos de neumonías por grupos de edad.**

A la S.E 35 los episodios de neumonía en los menores de 5 años representó el 87.74% (954/837) de todos los episodios reportados.

En las 35 primeras S.E se han reportado 837 episodios de neumonía en menores de 5 años, cifra superior en un 22.37% con respecto al año 2015 donde se reportó 684 episodios de neumonía.

En los menores de 1 año se reportó 338 episodios, así mismo se han reportado 499 episodios en los de 1 a 4 años y 101 en los niños de 5 a 14 años, cifras 18.8%, 25.8% y 8.6% superiores al año anterior para el mismo periodo.

De acuerdo al número de episodios notificados de neumonía por grupos etarios, en los menores de 1 año y de 1 a 4 años la curva se encuentra en la zona de epidemia en la S.E 35.



Tasa de Notificación de IRA en < de 5 años HEP 2016





Gráfico 9, 10. Tasa de Notificación de IRAS y Neumonías en menores de 5 años

La tasa promedio de notificación de casos de IRA en menores de 5 años en las primeras 35 S.E fue de 45.71 x100 y la tasa promedio de notificación de los episodios de neumonía fue de 5.52 x 100. Es decir que de cada 100 atendidos 45.71 fueron IRAs y 5.52 fueron Neumonías.

Tasa de Notificación de Neumonías en < de 5 años HEP 2016



Tasa de Severidad de Neumonía en < 5 años HEP 2016





Gráfico 11, 12. Tasa de Severidad y letalidad de Neumonía en menores de 5 años.


La tasa de severidad de neumonía hasta la S.E 35 fue de 30.38 x 100, lo que traduce la probabilidad de hospitalización que tienen los pacientes que sufren un episodio de neumonía y son atendidos en el HEP, para la semana 35 fue de 43.48 x100.

Tasa de Letalidad por Neumonía en < de 5 años HEP 2016



En relación a la tasa de letalidad esta fue de 0.24 x 100 durante las primeras 35 semanas epidemiológicas.

### Vigilancia de Virus Respiratorio HEP-2016




### Gráfico 13 y 14. Vigilancia de influenza y otros virus respiratorios.

En la primeras 35 semanas del año 2016 se han tomado 170 muestras de hisopado nasofaríngeo, de los cuales el 45% resultaron positivas (IFD/PCR hisopado nasofaríngeo).


A la fecha se han identificado 21 casos de Flu A H1N1pdm09, que representó el 28% y 40 casos de VSR que representó el 54% de las identificaciones.

### Vigilancia de Virus Sincial respiratorio (VSR) HEP 2013-2016



En las últimas 4 S.E se han reportado solo 4 casos de VSR.

### CANAL ENDEMICO DE ASMA BRONQUIAL EN MENORES DE 5 AÑOS H.E.P 2016




\*Fuente: Oficina de Estadística e Informática

### Gráfico 15. Vigilancia de Asma Bronquial.

En las 35 primeras semanas del año 2016 se han reportado 2755 episodios de SOB/ASMA, cifra superior en 6.12% a lo reportado el año 2015 para el mismo periodo.

El SOB/ASMA se encuentra en la actualidad en la zona de seguridad.






**Gráficos 16, 17, 18, 19 Canales endémicos de la EDA todas las edades.**

Entre la EDA Acuosa y Disentérica, en todos los grupos etarios, en las 35 primeras S.E se han reportado 4526 episodios de EDA; cifra superior en 16.98% con relación al año 2015 para el mismo periodo, donde se reportó 3869 episodios.


Los episodios de EDA Acuosa representaron el 92.44% (4184 episodios) y los episodios de EDA Disentérica el 7.56% (342 episodios).

Al analizar los casos de EDA en todos los grupos etarios, se aprecia que esta presentan una tendencia al incremento a partir de la S.E 23, este comportamiento se correlaciona con el de la EDA acuosa.

En las 35 primeras S.E del año 2016 se aisló Shigella en 101 casos, cifra superior en un 9.78% con respecto al año anterior.










**Gráficos 20, 21, 22. Canales Endémicos de la EDA en menores de 5 años.**


En las primeras 35 S.E del presente año, el 85.97% de los episodios de EDA se presentó en los niños menores de 5 años.

El número de episodios de EDA acuosa en menores de 5 años, en las 35 primeras semanas del año 2016 fue superior en un 15.38%, y para EDA disintérica fue similar.




**Gráfico 23. Vigilancia de EDA por Rotavirus.**

Se han confirmado 357 casos de EDA por Rotavirus en las primeras 35 S.E, lo que representó un incremento del 529% con relación a lo reportado el año anterior para el mismo periodo. En las 5 últimas semanas se presentó el 83% de los casos de Rotavirus, Actualmente la curva se encuentra en la zona de epidemia, con tendencia a la disminución.




**Gráfico 24. Vigilancia de EDAs por Adenovirus.**

Los casos confirmados de EDA por Adenovirus para las 35 primeras S.E del año 2016 fueron de 44, inferior en un 29.03% a lo del año 2015 para el mismo periodo.




**Gráfico 25. Vigilancia de febriles.**

Durante las 35 primeras S.E del año 2016 se han reportado 6221 episodios de febriles, cifra superior en 31.36% a lo reportado el año anterior. En la S.E 35 la curva se encuentra en la zona de epidemia.




**Gráfico 26, 27. Vigilancia de febriles.**

La vigilancia de los febriles hasta la S.E 35 muestra que el grupo más afectado fue el de 1 a 4 años (58.06%), seguido de los menores de 1 años (24.84%) y los distritos de donde más frecuentemente procedían fueron La Victoria, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lima.









**Gráfico 28. Vigilancia de accidentes por material punzo-cortante en trabajadores de salud.**

Durante el mes de Agosto no se reportó casos de accidentes punzo cortantes, ni casos de TBC Pulmonar entre los trabajadores.




**Gráfico 29. Vigilancia de generación de residuos sólidos hospitalarios biocontaminados.**

Durante el mes de Agosto se generaron 3368.60 kg de RRSS biocontaminados en el HEP, ligeramente superior al promedio.




**Gráfico 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vigilancia Centinela de NB + MB + Sepsis en menores de 5 años.**

Hasta Agosto del presente año, el 26.22% de las hospitalizaciones se debieron a casos sospechosos de neumonía bacteriana, de estos el 46.46% fueron catalogados como Neumonías probablemente bacterianas.




**Porcentaje de sospechosos investigados (Rayos X), HEP, 2016**




Hasta el mes de Agosto del 2016 a todos los casos sospechosos se les tomó Rx de tórax y al 96.19% de los probables hemocultivo.

Al mes de Agosto en los casos probables de Neumonía se aisló *Streptococcus pneumoniae*, en seis (06) oportunidades, siendo el porcentaje de casos confirmados de 5.94%.


**Porcentaje de probables NB con muestra de sangre, HEP, 2016**




**Porcentaje de casos confirmados de NB, HEP, 2016**



**Hallazgos etiológicos, HEP 2016**



**N casos sospechosos de meningitis en niños < 5 años, HEP, 2016**




**Gráfico 36, 37, 38, 39. Vigilancia Centinela de NB + MB + Sepsis en menores de 5 años.**

El 1.28% de los pacientes que ingresaron al HEP tuvieron diagnóstico de sospecha de MEC y de estos el 45.45% fue catalogado como probable MECB.


El 100% de los casos sospechosos tuvieron muestra de LCR tomado y procesado oportunamente.

**Porcentaje de casos probables de MB, HEP, 2016**




Hasta Agosto del 2016 se identificó un caso de MEC por Streptococo pneumoniae serotipo 24F en un niño de 5 meses y otro por Haemophilus influenzae b en un niño de 19 meses de edad.


**Porcentaje de casos sospechosos de meningitis investigados (Muestra LCR), HEP, 2016**



**Hallazgos etiológicos, HEP 2016**



### Aislamiento Bacteriano en Urocultivos HEP I Semestre 2016



Fuente: Servicio de Patología Clínica.  
Elaboración: Oficina de Epidemiología


### Gráficos 40, 41, 42 43, 44. Vigilancia de Sensibilidad Antibiótica.

#### Aislamiento bacteriano en Urocultivos.

Durante el primer semestre del año 2016 se han procesado 671 muestras de orina para urocultivo, de las cuales el 30.4% fueron positivas.

El agente más frecuentemente aislado fue E. coli (26.68%), seguido de Klebsiella pneumoniae (1.49%).

### Sensibilidad Antibiótica de E. coli Aislado en Urocultivo HEP I Semestre 2015-2016




Fuente: Servicio de Patología Clínica  
Elaboración: Oficina de Epidemiología

#### Sensibilidad de E. coli aislada en Urocultivos.

Al analizar la sensibilidad antibiótica de E. coli se encuentra que este tiene mayor sensibilidad para Amikacina, Nitrofurantoina, Cefoxitima, Ceftazidime y la menor sensibilidad para Ac. Nalidixico, Amp./Sulbactam, TMP/SMX y Ampicilina.

### Aislamiento Bacteriano en Coprocultivos HEP I Semestre 2016




Fuente: Servicio de Patología Clínica  
Elaboración: Oficina de Epidemiología

#### Aislamiento Bacteriano en Coprocultivos

En el I Semestre del año 2016 se han procesado 912 muestras de heces para coprocultivos, de las cuales el 58.55% fueron positivas.

Los agentes más frecuentemente aislados fueron Campylobacter (27.52%) y Shigella (20.61%).

Sensibilidad antibiótica de Shigella HEP I Semestre 2015-2016




Fuente: Servicio de Patología Clínica  
Elaboración: Oficina de Epidemiología

### Sensibilidad de Shigella sp. aislada en Coprocultivos

Los aislamientos de Shigella evaluados presentaron sensibilidad mayor al 90% para Ceftazidima, Ceftriaxona, Ciprofloxacino, Nitrofurantoina, Cefotaxima, Cefoxitina y Acido Nalidixico.

Sensibilidad Antibiótica de Campylobacter HEP I Semestre 2015-2016



Fuente: Servicio de Patología Clínica  
Elaboración: Oficina de Epidemiología

### Sensibilidad de Campylobacter aislada en Coprocultivos

Para Nitrofurantoina, Cloramfenicol y Amoxicilina/Ac. Clavulánico la sensibilidad de Campylobacter estuvo por encima del 90%. Para Eritromicina fue de 80%.

Tasa de IAASx 1000 exposiciones. HEP 2013 - 2016




Gráfico 45. Tasa de IAAS x 1000 días exposición, HEP 2013-2016.

La Tasa de Incidencia de IAAS para el mes de Agosto fue 1.20 x1000.

## INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD (IAS) 2016

MES	SERVICIO	PESO	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)				CATETER VENOSO PERIFERICO				CATETER URINARIO PERMANENTE				VENTILADOR MECANICO (VM)				HERNIOPLAST ING		
			Nº dias exposicion con CVC	Nº de pacientes vigilados	Nº ITS asociada a CVC	Tasa de ITS	Nº dias exposicion con CVP	Nº de pacientes vigilados	Nº ITS asociada a CVP	Tasa de ITS	Nº dias exposicion con CUP	Nº de pacientes vigilados	Nº ITS asociada a CUP	Tasa de ITS	Nº dias exposicion con VM	Nº de pacientes vigilados	Nº Neumonias asociado a VM	Tasa de NMN	No. pac operados	No. IIH	Tasa x 100
ENE	UTIP		134	18	0	0.0	123	26	0	0.0	72	13	0	0.0	77	11	0	0.0			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	48	2	0	0.0	28	2	0	0.0	37	2	0	0.0	36	2	0	0.0			
		>2500G	42	4	0	0.0	28	6	0	0.0	10	1	0	0.0	20	2	0	0.0			
	MED PED		8	1	0	0.0	338	68	0	0.0	0	0	0	0.0	31	1	0	0.0			
	CIRUG PED		86	7	0	0.0	535	11	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	12	0	0.0
FEB	UTIP		32	6	0	0.0	157	29	0	0.0	31	7	0	0.0	34	7	0	0.0			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	39	2	1	25.6	25	2	0	0.0	10	1	0	0.0	16	1	0	0.0			
		>2500G	26	2	0	0.0	27	3	0	0.0	1	1	0	0.0	0	0	0	0.0			
	MED PED		17	1	0	0.0	240	64	0	0.0	0	0	0	0.0	29	1	0	0.0			
	CIRUG PED		19	1	1	52.6	532	105	0	0.0	15	1	0	0.0	0	0	0	0.0	6	0	0.0
MZO	UTIP		118	13	1	8.5	110	26	0	0.0	74	12	0	0.0	96	15	0	0.0			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	45	2	0	0.0	38	4	0	0.0	21	2	0	0.0	35	2	0	0.0			
		>2500G	5	1	0	0.0	31	2	0	0.0	3	1	0	0.0	0	0	0	0.0			
	MED PED		0	0	0	0.0	293	71	0	0.0	0	0	0	0.0	31	1	0	0.0			
	CIRUG PED		11	1	0	0.0	664	137	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	10	0	0.0
ABR	UTIP		138	15	0	0.0	129	25	0	0.0	116	15	0	0.0	117	12	1	8.5			
	NEONATO	<1500G	19	1	0	0.0	10	1	0	0.0	10	1	0	0.0	10	1	0	0.0			
		1501-2500G	29	2	0	0.0	7	2	0	0.0	0	0	0	0.0	3	1	0	0.0			
		>2500G	39	2	0	0.0	31	2	0	0.0	15	2	0	0.0	28	2	0	0.0			
	MED PED		32	3	0	0.0	271	72	0	0.0	0	0	0	0.0	31	1	0	0.0			
	CIRUG PED		45	4	0	0.0	523	111	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	8	0	0.0
MYO	UTIP		98	14	0	0.0	121	21	0	0.0	96	11	0	0.0	128	14	1	7.8			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	0	0	0	0.0	7	1	0	0.0	0	0	0	0.0	7	1	0	0.0			
		>2500G	74	5	0	0.0	43	7	0	0.0	12	3	0	0.0	50	4	0	0.0			
	MED PED		40	3	0	0.0	245	61	0	0.0	0	0	0	0.0	31	1	0	0.0			
	CIRUG PED		66	5	0	0.0	483	110	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0	0.0
JUN	UTIP		165	17	0	0.0	100	20	0	0.0	104	16	0	0.0	125	22	1	8.0			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	20	1	0	0.0	2	1	0	0.0	7	1	0	0.0	8	1	0	0.0			
		>2500G	4	1	0	0.0	48	7	0	0.0	1	1	0	0.0	20	2	0	0.0			
	MED PED		16	3	1	62.5	222	70	0	0.0	0	0	0	0.0	30	1	0	0.0			
	CIRUG PED		30	7	0	0.0	505	104	0	0.0	15	1	0	0.0	0	0	0	0.0	5	0	0.0
JUL	UTIP		148	18	1	6.8	122	22	0	0.0	112	15	1	8.9	94	16	0	0.0			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	26	3	0	0.0	17	3	0	0.0	2	1	0	0.0	7	2	0	0.0			
		>2500G	46	5	0	0.0	32	9	0	0.0	22	2	0	0.0	19	4	0	0.0			
	MED PED		19	4	0	0.0	392	97	0	0.0	0	0	0	0.0	31	1	0	0.0			
	CIRUG PED		74	9	0	0.0	480	101	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0	0.0
AG	UTIP		184	17	0	0.0	83	23	0	0.0	106	16	0	0.0	118	15	2	16.9			
	NEONATO	<1500G	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0			
		1501-2500G	72	4	0	0.0	30	4	0	0.0	16	2	0	0.0	50	4	0	0.0			
		>2500G	14	3	0	0.0	14	1	0	0.0	1	1	0	0.0	5	2	0	0.0			
	MED PED		10	1	0	0.0	314	90	0	0.0	0	0	0	0.0	31	1	0	0.0			
	CIRUG PED		12	2	0	0.0	599	118	0	0.0	13	1	0	0.0	0	0	0	0.0	8	0	0.0

### HOSPITAL

Tasa IIH x 1000.	DIAS exposicion	No. pacientes vigilados	No. IIH	Tasa IIHx 1000
Agosto, 2016				
CVC	292	27	0	0.00
CVP	1040	236	0	0.00
CUP	136	20	0	0.00
VM	204	22	2	9.80
<b>TOTAL</b>	<b>1672</b>	<b>305</b>	<b>2</b>	<b>1.20</b>

### UCI (NEONATOLOGÍA)

Tasa IIH x 1000.	DIAS exposicion	No. pacientes vigilados	No. IIH	Tasa IIHx 1000
Agosto, 2016				
CVC	86	7	0	0.00
CVP	44	5	0	0.00
CUP	17	3	0	0.00
VM	55	6	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>


### UCI (PEDIATRÍA)

Tasa IIH x 1000.	DIAS exposicion	No. pacientes vigilados	No. IIH	Tasa IIHx 1000
Agosto, 2016				
CVC	184	17	0	0.00
CVP	83	23	0	0.00
CUP	106	16	0	0.00
VM	118	15	2	16.95
<b>TOTAL</b>	<b>491</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>4.07</b>

Durante el mes de Agosto se reportó dos casos de IAS, correspondiente a NAV en el Servicio de Cuidados Intensivos (Pediatria).




**CANALES ENDEMICOS DE ITS ASOCIADOS A CVC SCI-NEO**



**Gráfico 46. Tasa de IIH x 1000 días exposición Asociado a CVC en Neonatos año 2016, según mes.**

En el mes de Agosto no se reportó casos de ITS asociado a CVC en neonatos.


**Comportamiento de la NAV SCI Neo HEP 2012-2016**



**Gráfico 47. Tasa de IIH x 1000 días exposición Asociado a VM en Neonatos año 2016, según mes.**


En el mes de Agosto no se reportó casos de NAV en neonatos.

**COMPORTAMIENTO DE LA ITU ASOCIADA A CUP SCI NEO HEP 2012 - 2016**




**Gráfico 48. Tasa de IIH x 1000 días exposición Asociado a CUP en neonatos año 2016, según mes.**

En el mes de Agosto no se reportó casos de infecciones asociadas a CUP.




**Gráfico 49.**Tasa de IIH x 1000 días exposición Asociado a CVC en el Servicio de Cuidados Intensivos año 2016, según meses.

En el mes de Agosto no se presentó casos de ITS asociadas a CVC.



**Gráfico 50.**Tasa de IIH x 1000 días exposición Asociado a VM en el Servicio de Cuidados Intensivos año 2016, según mes.

Durante el mes de Agosto se reportó dos (2) casos de NAV, lo que significó una T.I de 16.9 x 1000.




**Gráfico 51.**Tasa de IIH x 1000 días exposición Asociado a CUP en el Servicio de Cuidados Intensivos año 2016, según mes.

En el mes de Agosto no se presentó casos de ITU asociado a CUP..


**Gráfico 52. Vigilancia de Accidentes de Tránsito.**

Durante el mes de Agosto se han reportado 13 casos de accidentes de tránsito, cifra superior a lo reportado el año 2015 para el mismo periodo.




**Gráfico 53. Lesiones por Accidentes de Tránsito según horas de ocurrencia.**

Hasta el mes de Agosto la mayor proporción de accidentes de tránsito, ocurrió entre las 12:00h y las 17:59h.



**Gráfico 54. Accidentes de Tránsito Según Tipo de Accidente**

Entre los pacientes que sufrieron accidentes de tránsito hasta el mes de Agosto, el tipo de accidente de tránsito más frecuente fue el atropello.



# Organizaciones Internacionales de Emergencias Pediátricas

Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP)  
Jordi Pou ([jpou@hsjdbcn.org](mailto:jpou@hsjdbcn.org))

## Pediatric Emergency Medicine Organizations



ACEP - Pediatric Emergency Medicine Section  
Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP)  
Alberto Villani ([villani.alberto@tiscalinet.it](mailto:villani.alberto@tiscalinet.it))



[Pem-Database.Org](http://Pem-Database.Org)

Homepage  
Asociación Mexicana de Urgenciólogos Peditras  
Sergio B. Barragán Padilla ([presidencia@amup.org.mx](mailto:presidencia@amup.org.mx))



## IPEG

The International Pediatric Emergency Group Discussion list



ÇOCUK ACL TIP VE YOUN BAKIM DERNEGI  
Hayri Levent YILMAZ ([hyilmaz@mail.cu.edu.tr](mailto:hyilmaz@mail.cu.edu.tr))



Groupe Francophone de Réanimation & Urgences Pédiatriques (GFRUP)  
Gérard Cheron ([gerard.cheron@nck.ap-hop-paris.fr](mailto:gerard.cheron@nck.ap-hop-paris.fr))



Paediatric Emergency Medicine Society of Australia and New Zealand (PEMS)  
Simon Chu ([emergskyc@yahoo.ca](mailto:emergskyc@yahoo.ca))



Pediatric Emergency Medicine Israel (PEMI)  
Yehezkel Waisman ([waisy@clalit.org.il](mailto:waisy@clalit.org.il))



Association of Paediatric Emergency Medicine